Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Erweiterung des angepassten Brutraum zur Zeit des Vorfrühlings.(Blüte Salweide)



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Erweiterung zur Zeit der Kirschblüte mit dem Honigraum.



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Erweiterung des Honigraum, sobald der Erste zu einem drittel gefüllt ist.



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Neben dem Schied befindet sich eine Pollenwabe mit Brut oder eine Pollenwabe mit Futter Reserve.

Diese Wabe im Bereich des Schied belassen, mehr Pollenwaben dürfen sich jedoch nicht innerhalb des Schied befinden befinden.



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Neben dem Schied kann die Wabe auch so aussehen, sie ist gefüllt mit Brut, Pollen und Futter.



Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf
Meine Bank

Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Diese Wabe befindet sich neben der Pollenwabe

Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

In weiterer Folge sind vollbebrütete Waben angeordnet

Die Brut reicht bis zum Oberträger

Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Den Abschluss bildet die Drohnenwabe

Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Eine Woche nach der Kirschblüte, hier sieht man die optimale Aufteilung von Brut, Pollen und Honig



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Hat man im Brutraum diese Waben und legt man ein Absperrgitter auf, werden die Bienen den Honigraum kaum annehmen.

Futterkranz zu Hoch!

Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Befindet sich zur Zeit der Kirschblüte ein Honigkranz über dem Brutnest nehmen die Bienen den Honigraum nicht an und gehen in die Schwarmlust.



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Befindet sich zur Zeit der Kirschblüte ein Honigkranz über dem Brutnest nehmen die Bienen den Honigraum nicht an und gehen in die Schwarmlust.



Erweiterung vom Vorfrühling bis zum Erstfrühling

Verpollte Waben in der Mitte des Brutnest oder Waben mit löchriger Brut werden entfernt und für Ableger verwendet, nach dem Auslaufen der Brut werden sie entfernt und eingeschmolzen.

Löchrige Brutwaben entfernen!

Pollenwaben in der Mitte des Brutnest entfernen