

Spätsommerpflege nach der Honigernte



Spätsommerpflege nach der Honigernte

Senkrechtes Absperrgitter

Das senkrechte Absperrgitter ist eine gute Möglichkeit die Königin auf eine oder zwei Waben zu sperren damit die restliche Brut ausläuft.

Findet man die Königin nicht dann steckt man das Absperrgitter einfach zwischen die Brutwaben



Das senkrechte Absperrgitter muss rundherum Dicht sein, die Abstände zwischen den Beutenteilen dürfen 4mm nicht übersteigen .

Betriebsweise Senkrechtes Absperrgitter




Spätsommerpflege nach der Honigernte

Das senkrechte Absperrgitter wird am 21.6 eingefügt und sperrt die Königin auf 2 Waben für mindestens 25 Tage.

Betriebsweise Senkrecht Absperrgitter


Brutwaben auf welche die Königin sitzt können bei Bedarf nach 12 Tagen entnommen werden und zur Ablegerbildung verwendet werden. Die zwei entnommenen Waben werden mit ausgebauten Waben ersetzt. Die Königin bitte im abgesperrten Bereich lassen.



Spätsommerpflege nach der Honigernte

Am 16.7 sind die Brutwaben bis auf die zwei auf welcher die Königin sitzt ausgelaufen und mit Honig gefüllt.

Betriebsweise Senkrecht Absperrgitter



Spätsommerpflege nach der Honigernte

5

Ein paar Bilder wie man die Bienen aus dem Honigraum verwendet.



Brutraumzarge mit Futtertasche Königin und Mittelwänden. **Siehe Folie 7**



Bienen von einer Honigwabe werden in den Brutraum auf die Königin geschüttelt. **Siehe Folie 7**



Hier sieht man wie die Bienen vom Honigraum durch den Nicot Fütterer welcher als Bienenflucht verwendet wird zur Königin krabbeln.



Dieses Bild zeigt die Aufstellung. Der Brutraum mit den Honigräumen. Das Flugloch ist verschlossen und die Varroatasse zur Hälfte eingeschoben. **Siehe Folie 7**

Spätsommerpflege nach der Honigernte

Wenn die Bienen vom Honigraum nicht zur Bildung von neuen Völkern verwendet werden, empfiehlt es sich eine Leerzarge über den Brutraum zu stellen und dann erst den Fütterer und Honigzargen. Man kann auch die Bienen vom Honigraum direkt in die Leerzarge kehren und ohne Bienenflucht arbeiten. **Siehe Folie 12**




Leertzarge damit die Bienen platz haben




Nicot Fütterer als Bienenflucht

Spätsommerpflege nach der Honigernte



Bienenvolk am 15.7


Alter Standplatz,
Brut mit ansitzenden
Bienen und Königin



Bienenvolk am 16.7 um 6 Uhr Morgens

Neuer Standplatz,
kann auch nur 2
Meter entfernt vom
alten sein. Wird am
16.7 um 6 Uhr
Morgens erstellt

Futtertasche
mit 2-3 Liter
Zuckerwasser
1: 1



Betriebsweise
Senkrechtes
Absperrgitter


Bienenflucht

4-5 Bienen besetzte Honigräume am Morgen über der neuen Königin geben, dabei eine Honigwabe voll mit Bienen in den Brutraum zur Königin schütteln. Fluglochgitter schließen, Varroa Schieber ist offen.


Spätsommerpflege nach der Honigernte

Betriebsweise
Senkrechtes
Absperrgitter

Am nächsten Tag 17.7 nach der Abnahme der Honigräume werden die zwei Brutwaben entfernt und eingeschmolzen, die Königin wird frei gelassen.



Spätsommerpflege nach der Honigernte




Spätsommerpflege nach der Honigernte

10

Alter Standplatz


X+ 8 Tagen



Alle 7 Tage 2-3 Liter
Zuckerwasser 1:1
geben.

Neuer Standplatz

mit Bienen aus
dem Honigraum
X+ 11 Tagen




Bienenmasse mit dem
Schied Anpassen. Alle 7
Tage 2-3 Liter
Zuckerwasser 1:1 geben

Dämmschied

Betriebsweise
Senkrechtes
Absperrgitter


Spätsommerpflege nach der Honigernte

Totale Brutentnahme Vorbereitungen




Bienenvolk vor der totalen Brutentnahme

3 verschiedene Varianten: Wie man die Bienen bei der Honig Ernte aus dem Honigraum bekommt.




Variante 1: 4-5 Bienen besetzte Honigräume am Morgen über der neuen Königin (im Zusatzkäfig)geben, dabei eine Honigwabe voll mit Bienen in den Brutraum zur Königin schütteln. Fluglochgitter schließen, Varroa Schieber ist offen.

Bienenflucht



Variante 2: Damit man die Bienen aus dem Honigraum bekommt, Bienenflucht vor Flugbeginn am Morgen einsetzen.




Variante 3: Bei wenigen Völkern kann man die Bienen gleich am Morgen von den Waben abkehren. Eine leere Zarge erleichtert das.

Spätsommerpflege nach der Honigernte

13

Totale Brutentnahme


Bienenvolk vor der totalen Brutentnahme.



Der Honigraum wird bei der Brutentnahme abgenommen, die Bienen von den Honigrähmchen werden in den Brutraum gekehrt.


Alte Brutwaben werden eingeschmolzen!!

Tag X spätestens am 25.7



Alle Bienen mit Königin und einer offenen Brutwabe kommen in eine neue Zarge, der Boden bleibt am alten Standplatz. Sofort 3-5 Liter Zuckerwasser 1:1 geben. Bei hohem Varroa Druck mit VarroMed träufeln.

Tag X + 7




Offene Brutwabe die bereits verdeckelt ist entfernen. Mit 30 ml VarroMed träufeln. 3-5 Liter Zuckerwasser 1:1 geben.

Spätsommerpflege nach der Honigernte

14


Totale Brutentnahme

Tag X + 7




Offene Brutwabe die bereits verdeckelt ist entfernen.
Mit 30 ml VarroMed träufeln. 3-5 Liter Zuckerwasser 1:1 geben.

Tag x +14 Tage



Bienenmasse mit dem Schied Anpassen. Alle 7 Tage 2-3 Liter Zuckerwasser 1:1 geben, bei Bedarf Brutraum mit Mittelwand erweitern.

X+ 30 Tagen




30ml VarroMed Träufeln, Kontrolle auf Reinfektion von Varroa, wenn mehr wie 90 Milben nach 7 Tagen fallen noch zwei mal VarroMed träufeln das im Abstand von 7 Tagen. Alle 7 Tage 2-5 Liter Zuckerwasser 1:1 geben.

Am 10.September 30ml VarroMed träufeln

Spätsommerpflege nach der Honigernte


15

Varroa Behandlung mit Königinnen Ableger




Bienenvolk viele Varroen und Stark verpollt.

Tag X Königin entfernen




15.7 Königin mit zwei Brutwaben mit einer Pollen Futterwabe entfernen.

Königin Ableger ab 15.7



Auf neuen Standplatz bringen

Königin Ableger ab 22.7 behandeln.



15-30ml VarroMed Träufeln, dann noch zwei mal VarroMed träufeln das im Abstand von 7 Tagen.

Alle 7 Tage 2-5 Liter Zuckerwasser 1:1 geben.




Am 10. September 30ml VarroMed träufeln


Spätsommerpflege nach der Honigernte

Varroa Behandlung mit Königinnen Ableger

Tag X +7




Bienenflucht



22.7 Weiselzellen brechen und Königin zusetzen.


22.7-25.7 Honigernte +2-5Liter Zuckerwasser

Tag X+14



Beginn der Behandlung
28.7 VarroMed
Behandlung + Fütterung 2-5Liter

Tag X +21




4.8 VarroMed
Behandlung
+Fütterung 2-5
Liter

Spätsommerpflege nach der Honigernte


Varroa Behandlung mit Königinnen Ableger

Tag X +21




4.8 VarroMed
Behandlung

Tag X +28



12.8. VarroMed
Behandlung

Am 10. Sept.



30ml VarroMed Träufeln,
Kontrolle auf Reinfektion von
Varroa, wenn mehr wie 90
Milben nach 7 Tagen fallen noch
zwei mal VarroMed träufeln das
im Abstand von 7 Tagen.
Alle 7 Tage 2-5 Liter
Zuckerwasser 1:1 geben.